

Best Management Practice (BMP) – Dollarspot op Golfgreens

Onderstaand protocol bevat praktische richtlijnen om dollarspot proactief en geïntegreerd te beheersen op golfgreens.

1. Proactief handelen met predictietools

Gebruik de Turf Disease Prediction App of vergelijkbare tools om ziektedruk tijdig te signaleren.

Monitor groeigraad- of ziekte-indexen en plan interventies vóór visuele symptomen.

2. Voorkómen van droogtestress

Gebruik vochtmeters (TDR/volumetrisch) om lokale droogte op tijd te detecteren.

Houd het vochtgehalte stabiel, vooral in de vroege ochtend en late middag.

3. Regelmatig rollen

Rollen met een greensroller kan de microklimaatomstandigheden veranderen en zo de ziektedruk verlagen.

Bevordert bladdroging en vermindert schade van schimmelinfectiepunten.

4. Dauwverwijdering en nachtelijke dauwcontrole

Ochtenddauw vegen vermindert bladnatheid.

Nachtelijke beregening ('syringing') bij hoge luchtvochtigheid om dauw- en myceliumvorming vóór zonsopgang te verstoren.

5. Evenwichtige bemesting – focus op stikstof

Houd een stabiele stikstofvoorziening (geen pieken/dalen) om grasgroei veerkrachtig te houden.

Vermijd overmatige groei, maar voorkom ook stress door tekorten.

6. Afharden met ijzersulfaat

Toepassing van lichte doseringen ijzersulfaat (± 20 kg/ha FeSO_4) (1 a 2 wekelijks)

Verlaagt bladoppervlakte-pH, verhoogt grasweerstand en kan dollarspot remmen.

Let op: vermijd verbranding door niet te spuiten tijdens felle zon of hitte of bij droogtestress !

